

Recomendaciones de exclusión de Enfermedades y Síntomas

Regulaciones 2023

Enfermedad y/o Síntoma	<u>Exclusión/Readmisión</u> de acuerdo con <u>K.A.R. 28-1-2</u> , <u>28-1-6</u> y Estatuto de Kansas <u>65-122</u>
Pie de atleta/Parásitos intestinales	Sin exclusión necesaria.
COVID-19** (Vea Recomendaciones de los CDC)	Excluir por 5 días después del comienzo de los síntomas o día de la prueba positiva, de ser asintomáticos. Use mascarilla hasta el día 10; si no puede usar mascarilla, excluir por 10 días. Los Contactos deberían usar mascarilla por 10 días después de la última exposición, recomiende tomar la prueba el día 6. Estrategias de mitigación por capas deben ser utilizadas. Consulte las políticas específicas de la escuela o guardería.
Diarrea/Vomito/Sarpullido	Libre de diarrea por 24 horas sin la ayuda de medicamento/ Libre de vomito por 24 horas / Sarpullido: Considere la exclusión en la espera de una evaluación médica.
E. Coli (Shiga Toxin—producing E. Coli including E. Coli 0157:H7 and O26) *	Solamente para Guarderías: Excluir hasta que se obtengan dos cultivos de heces negativos (deben ser con 24 horas de diferencia y 48 horas después de haber discontinuado los antibióticos) Escuela: Estar libre de diarrea por 24 horas sin la ayuda de medicamento
Ojos inflamados con flujo purulento	Sin exclusión. De ser conjuntivitis bacteriana, se les permite permanecer en la escuela una vez que el tratamiento prescrito sea implementado.
Fiebre con o sin síntomas	Hasta estar libre de fiebre por 24 horas sin la ayuda de medicamentos.
Quinta Enfermedad	Excluir hasta estar libre de fiebre por 24 horas sin la ayuda de medicamentos, no se considera contagiosa una vez que el sarpullido ha aparecido.
Enfermedad de Manos, Pies y Boca	Excluir hasta estar libre de fiebre por 24 horas sin la ayuda de medicamento y sin lesiones abiertas.
Hepatitis A*	Excluir por 14 días después del comienzo de la enfermedad/7 días después del comienzo de la ictericia.
Impétigo	Excluir hasta haber recibido tratamiento con antibiótico por 24 horas o nota del doctor.
Influenza	Diagnosticada por el Medico: Excluir por 5 días después de la aparición de la enfermedad. Si la fiebre continua más de 5 días, continuar la exclusión por 24 horas después de haber estado libre de fiebre.
Sarampión*	Excluir por 4 días después del comienzo del sarpullido; los contactos susceptibles que no estén vacunados apropiadamente de acuerdo con la edad durante las primeras 72 horas después de la exposición, serán excluidos por 21 días después de la última exposición a un caso infeccioso.
SARM (MRSA por sus siglas en ingles)	Si las lesiones están cubiertas, no hay necesidad de exclusión; Si las lesiones no pueden cubrirse, excluir hasta que las lesiones hayan formado costra
Mononucleosis	Hasta estar libre de fiebre por 24 horas sin la ayuda de medicamentos.
Paperas*	Excluir 5 días desde de la aparición de parotiditis; contactos susceptibles serán excluidos del día 12 al día 25 después de la exposición a un caso infeccioso.
Protosis/Tosferina	Excluir hasta completar la terapia de antibióticos apropiada (los contactos susceptibles no necesitan ser excluidos, solo monitoreados).
Tiña	Excluir hasta el comienzo del tratamiento; evitar actividades de contacto de piel a piel hasta que las lesiones estén completamente recuperadas.
Rubiola (Sarampión alemán) *	Excluir por 7 días después del comienzo del sarpullido; contactos susceptibles serán excluidos por 21 días después de la última exposición.
Sarna	Excluir hasta finalización del tratamiento con un antiparasitario aprobado.
Shigelosis*	Guarderías Solamente: Excluir hasta que se obtenga un cultivo de heces negativo (tomado 48hrs después de la discontinuación de antibióticos) Escuela: Libre de diarrea por 24 horas sin la ayuda de medicamentos.
Culebrilla (Herpes Zóster)	Si las lesiones pueden cubrirse, sin exclusión; si las lesiones no pueden cubrirse, excluir hasta que las lesiones hayan formado costra.
Enfermedad de estreptococo (fiebre escarlatina y dolor de garganta estreptocócico)	Excluir por 24 horas después del comienzo de la terapia antimicrobiana; si no está recibiendo terapia, excluir por 10 días después del comienzo de los síntomas.
Varicela*	Excluir hasta que las lesiones han formado costra o se hayan secado; cada contacto susceptible no vacunado de acuerdo con la edad durante las primeras 72 horas después de la exposición deberá ser excluido por 21 días después de la última exposición a un caso infeccioso.

Rv. 8/23 *Llame al Departamento de Salud para guías adicionales, 913-826-1303

** Guarderías: 913-477-8361

Health

11875 S. Sunset, Suite 300, Olathe, KS 66061
6000 Lamar, Suite 140, Mission, KS 66202
(913) 826-1200 • fax (913) 826-1300
TDD: 800-766-3777

jocogov.org



Environmental & Child Care Licensing

11811 S. Sunset, Suite 2700, Olathe, KS 66061
Environmental (913) 715-6900 • fax (913) 715-6970
Child Care (913) 477-8339 • fax (913) 477-8035
TDD: 800-766-3777